

二 三 地 方 の 多 足 類

高 桑 良 興

東京文理科大学動物學教室

(1) 對 馬 産

茲に掲げるものは九州帝大農學部白水隆氏の採集にかゝる。朝鮮系統のものは混つてゐない（後出の濟州島産には朝鮮系のものがある）。

1 脣足類

Bothropolys asperatus Koch イツスムカデ

我國全地滿洲南洋に及び分布するもの。

Monotarsobius takakuwai Verhoeff ヒトフシムカデ

Mecistocephalus marmoratus Verhoeff ブチナガヅデムカデ

Prolamnyx holstii Pocock ツメデムカデ

北海道より臺灣朝鮮に至る廣き範圍に分布し、個體數も多く、41對の歩肢を有するもの。

Scolopendra subspinipes japonica L. Koch アヲヅムカデ

Thereuonema hilgendorfi Verhoeff ゲジ

2 倍足類

Epanerchodus bifidus Takakuwa (ヒタカツ, ニシドマリ, 權現山)

曩に熊本縣阿蘇山で捕へられたものと同種。

E. sp. ♂のみで同定困難なもの數頭。

Orthomorpha sp. ♀のみで同上。

Rhysodesmus shirozui Takakuwa (同上權現山)

アマビコヤスデの一種で、今回始めて發見せられたもので、詳しい形態は動物學雜誌6月號の速報欄で發表するが、體長25體幅4mm程の茶褐色のもので、生殖肢の根に大中小の3個の突起を生ずるもの。

(2) 奈良市外春日山産

次のものは東京文理科大學學生附田惠氏の奈良市外春日山に於て採集せられたもので、氏はこれと共にダニ類、等脚類其他合計十數個を提出せられた。

1 唇足類

Bothropolys asperatus Koch (前出) イツスンムカデ

Otocryptops sexspinosus (Say) アカムカデ

日本・支那・北米に及んで分布するが、滿洲にては未だ得られず、北海道にも自然には棲息せぬやうである。

Scolioplanes maritimus japonicus Verhoeff ヤマトスコリデムカデ

紅褐色のものが多く、歩脚は50對計り、*Sc.* 屬中で最も數多く又分布廣いものだが、臺灣には産せぬ。

2 倍足類

Bazillozonium nodulosum Verhoeff

本種は先年予が英彦山に於て得たもので、體長10 mm 位で幅が廣く扁く、黄赤色を呈し 普通の馬陸の如くに體を捲曲する性がない。予はその後大阪府高見 京都市外鞍馬山で1—2個を得たが茲にまた奈良地方にも産することを知つた。

Epanerchodus japonicus (Carl)

オビヤスデ中のもので、餘り澤山はをらぬが、昨年予は竹生島に於てこれを得た。

E. sp. ♀のみにて同定できかねるもの數個。

Fusiulus acutus Takakuwa

予は先年愛知縣田原町、長野縣下條村にてこれを得た。

Glomeris sp.

タマヤスデの1種であるが、種名同定は都合に依つて後日にのばす。

Japonaria spiriligera Verhoeff

予が滋賀縣石山寺附近で得たものにつき V. 氏が新種として命名したものと同種であるが、予は同氏の記載につき疑を有し、最近日本動物學彙報で訂正せんとするのであり、今茲に得た標本につきても、予の見る所が正しいと判ずる。

Orthomorpha gracilis (C. L. Koch) ヤケヤスデ

世界的に廣く分布するもの。

Syntelopneuma sp.

本属の日本種は3種知られて居るが、本動物はそのいづれに属するか尙精研を要するものがあり、暫くお預りとする。

Onomatoplanus sp.

本属には已知種2あり、その1は東京附近で予が発見したもので、他はその後、印度支那で得られたものであるが、更に予は--昨年別府附近で1新種を得た(未発表)。茲に得られたものは正に新種であるが、種々の疑點があるからこれも暫らくお預りとする。體長數 mm. で、體節20個、各背板に小疣起が4列に並んでゐる。

(3) 佛 印 産

次のものは陸軍で採集されたものを、軍醫學校に關係せられる大島正満博士の御厚意に依つて拜見したものである。

Scolopendra subspinipes haani Brandt

佛印ブノンベン及びカプサンチナップの産で、内地産のオホムカデと同原種に属する亞種で、體長150、體幅15 mm 程の巨大なものである。本種の數亞種中の最も大なるもので200 mm に達するものもあるといふ。相當に毒が烈しいやうに思はれる。

Scolopendra morsitans L. タイワンオホムカデ

我國内地には居らぬが臺灣琉球にあり、又世界に廣く分布するものである。

(4) 比 島 Atong Atong 産

次のものは山村八重子氏がヒリツピンのバシラン島 Atong Atong 附近で集められたものである。

Ethmostigmus platycephalus cribrifer (Gervais)

巨大なフルキムカデで、我が南洋に於ても小形なのを見たが、本動物は體長180、體幅16 mm あり、各氣門が篩狀に孔を有する特徴がある。

Otostigmus politus Karsch

朝鮮・北支那にも産する種で、分布につき聊か疑がないでもない。

Scolopendra subspinipes subspinipes Leach

我國に多いオホムカデの原種である。

Polyconoceras sp.

巨大な馬陸で、體長100、體の直徑8 mm あり、圓筒狀丸紐形、黒色で各體節の後縁黄色を帯ぶ。比島には *P. cupulifer* Voges があるといふも、この動

物はそれではなく、種名同定はこれも後日發表する。

(5) 澎湖島

鄭枝實氏の採集にかゝるもので、皆内地に産せぬ。

Scolopendra morsitans L. タイワンオホムカデ 前出

Rhysida longipes brevicornis Takakuwa オンリシダムカデ

臺南に於て始めて故王雨卿氏の採集せられしもの。

Mecistocephalus multidentatus Takakuwa シマナガヅデムカデ

49對の歩肢を有し、曾て臺北にて得られしもの。

(6) 濟州島

上田常一氏の採集せられたもの。

Scolopendra subspinipes mutilans L. Koch トビヅムカデ

Otostigmus politus Karsch テウセンムカデ

前出したものであるが、これは朝鮮系に屬するもの。

Otocryptops rubiginosus (L. Koch) セスデアカムカデ

Prolamnonyx holstii Pocock ツメデムカデ

以上不完全な報告であるが、一先づ掲げることとし、關係諸氏に深く御禮を申し上げる。

東亞蜘蛛關係文獻目錄

第15輯 (1942年度第1回及1941年度分補遺)

- 1 工藤 茂美——ジョウラウグモとエドコマチグモ——採集と飼育 1—1:7, 3圖
ジョウラウグモの生態寫眞2種及びエドコマチグモの巢の寫眞を示す。
- 2 高島春雄・關口晃——口から絲を吐く蜘蛛——日本の科學 1—3:19—26, 3圖
ユカタヤマシログモの寄習に關する從來の小松 植村兩氏の觀察を紹介し併せて口から絲を吐く爲の構造の組織學的所見を記してある。歌舞伎の「土蜘蛛」に關する小記がある。
- 3 山田 崑治——白ひめ蜘蛛の懸巢の觀察 附 習性上からみた蜘蛛の進化——動物文學 85:62—63